

Résumé des techniques

Adulte, enfant ou bébé inconscient qui s'étouffe



- 1** Procédez à une vérification des lieux.
- 2** Déterminez le niveau de conscience.
- 3** Ouvrez les voies respiratoires.
- 4** Commencez les compressions thoraciques (30 compressions).



- 5** Commencez les compressions thoraciques (30 compressions).
- 6** Ouvrez les voies respiratoires du patient et donnez 1 ventilation.
- 7** Si l'air ne pénètre pas, repositionnez la tête et essayez de ventiler de nouveau. Si l'air ne pénètre toujours pas, répétez un cycle de 30 compressions.
- 8** Regardez dans la bouche pour identifier le corps étranger (en tenant la langue et la mâchoire inférieure); enlevez l'objet si vous le voyez.



- 9** Essayez de ventiler.
- 10** Si l'air ne pénètre pas, continuez la séquence de RCR de 30 compressions et de 2 ventilations. Si le premier souffle réussit, donnez une autre ventilation.
- 11** Vérifiez le pouls. S'il n'y a pas de pouls, suivez la séquence de RCR.
- 12** Si vous sentez le pouls, suivez la séquence de respiration artificielle.
- 13** S'il y a un changement dans l'état du patient, arrêtez la RCR et vérifiez les points ABC.

